

Negret n°1



0MTP1496



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1496

Vass2R04s311-315

O-1496
Negret n°1
R4 s311-315


AmpFH

0Mtp1496 Negret n°1

Cépage non identifié

Vass2R04s311-315

GG







Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

203
Année :2010
Code cépage : 0Mtp1496
NomVar : Cépage non identifié
Nom introduction :Negret n°1
Observateur :
Emplacement :Vass2R04s311-315

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	9		26/3		
2	7		26/3		
3	7		24/3		
4	5		22/3		
5	7		22/3		
Moyenne			24/3		

-5

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
			12/07	19/07	20/8	

0

Formulaire de description 4 / 8
Observation entre stades de nouaison et de véraison

P1

Année : 2010

Observateur : *Laumbe.*

Programme : GrapGene06

Code introduction : 0Mtp1496

Nom introduction : Negret n°1

Emplacement : Vass2R04s311-315

LIMBE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 065	Taille	Très petite	<u>Petite</u>	Moyenne	Grande	Très grande
Oiv 067	Forme du limbe	1-Cordiforme	2-Cunéiforme	3-Pentagon.	<u>4-Orbicul.</u>	5-Rénif.
Oiv 068	Nombre de lobes	1-F. entière	2-Trois	<u>3-Cinq</u>	4-Sept	5- + de sept
Oiv 069	Couleur face supérieure limbe		Vert clair	<u>Vert moyen</u>	Vert foncé	
Oiv 070	Pigmentation anthocyannique (rouge) des nervures, face supérieure	1- Nulle	2- Point pétiole	<u>3- Jusqu'à 1^{ère} bifurc.</u>	4- Après 1 ^{ère} bifurc.	<i>faible, rose</i>
Oiv 071	Pigmentation anthocyannique (rouge) de nervures, face inférieure	1- Nulle	2- Point pétiole	<u>3- Jusqu'à 1^{ère} bifurc.</u>	4- Après 1 ^{ère} bifurc.	<i>idem</i>
Oiv 074	Profil du limbe	1-Plan	2-En V	3-Involuté	4-Révoluté	<u>5-Tourmenté</u> <i>voque</i>
Oiv 073	Ondulation du limbe (entre nerv I ou II)	<u>Absente</u>				Présente
Oiv 072	Gaufrure du limbe (dépression entre nervures I et II)	<u>Absente</u>				Présente
Oiv 075	Cloûre du limbe, face sup. (relief entre nervures de dernier ordre)	Nulle à t. fb.	Faible	<u>Moyenne</u>	Forte	Très forte
Oiv 084	Densité p. couchés entre nerv. face inf.	Nulle à t. fb.	<u>Faible</u>	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 085	Densité p. dressés entre nerv. face inf.	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 086	Densité p. couchés des nerv. face inf.	Nulle à t. fb.	<u>Faible</u>	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 087	Densité p. dressés des nerv. face inf.	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 088	Villosité couchée nerv.principales face sup	<u>Absente</u>				Présente
Oiv 089	Villosité dressée nerv. principales face sup	<u>Absente</u>				Présente
Vassal	Densité p. couchés limbe face sup.	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Vassal	Densité p. dressés limbe face sup.	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

PETIOLE

Oiv 090	Densité poils couchés	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 091	Densité poils dressés	<u>Nulle à t. fb.</u>	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 093	Longueur pétiole p/r nervure médiane	Beaucoup plus court	Plus court	<u>Égal</u>	Plus long	Beaucoup plus long
Vassal	Couleur du pétiole	<u>1-coloré</u>	2-partiellement coloré	3-vert	<i>violacé</i>	

SINUS PETIOLAIRE (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 079	Ouverture	1-très ouvert	2- ouvert	<u>3- peu ouvert</u>	<u>4- fermé</u>	5- lobes chevauchants	6- lobes très chevauchants
Oiv 080	Forme de la base		1- en U	2- en accolade	<u>3- en V</u>		
Oiv 81-1	Dent sur le bord		<u>1- Absence</u>	2- Présence assez fréquente de 1 ou 2 dents			
Oiv 81-2	Base dégarnie		<u>1- Absence</u>	2- sur 1 côté	3- sur 2 côtés		

SINUS LATÉRAUX SUPÉRIEURS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 082	Ouverture	1- absence de sinus	2- ouverts	<u>3- fermés</u>	4- lobes très chevauchants	
Oiv 094	Profondeur des sinus latéraux supérieurs	Absence	<u>Peu profond</u>	<u>Moyens</u>	Profonds	Très profonds
Oiv 83-1	Forme		<u>1- en U</u>	2- en accolade	3- en V	
Oiv 83-2	Dent		<u>1- Absence</u>	2- Présence fréquente		

DENTS (également observable sur feuilles d'herbier, formulaire n° 7)

Oiv 076	Forme	1- côtés concaves	2- côtés rectilignes	<u>3- notations 2 + 4</u>	4- côtés convexes	5- un côté concave et l'autre convexe
Oiv 077	Taille	Très petites	<u>Petites</u>	Moyennes	Grandes	Très grandes
Oiv 078	Rapport longueur/largeur	Très courtes	Courtes	<u>Moyennes</u>	Longues	Très longues

AUTRE CARACTÈRE OBSERVABLE À CETTE PÉRIODE

Oiv 501	Taux de nouaison (7 à 14 j. après flor.)	Très faible (<10%)	Faible (11-30%)	Moyen (31-50%)	<u>Élevé (51-70%)</u>	Très élevé (>80%)
---------	--	--------------------	-----------------	----------------	-----------------------	-------------------

Formulaire de description 5 / 8

Observation à maturité physiologique

Année: 2010

Observateur: LACOMBE

Programme : GrapGene06

Code introduction : 0Mtp1496

Nom introduction : Negret n°1

Emplacement : Vass2R04s311-315

GRAPPE

Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 202	Longueur Valeur absolue (en cm) : 13	Très courte (<10 cm)	Courte (10-14 cm)	Moyenne (14-18 cm)	Longue (18-25 cm)	Très longue (>25 cm)
Oiv 203	Largeur Valeur absolue (en cm) : 10	Très étroite (<5 cm)	Etroite (5-10 cm)	Moyenne (10-15 cm)	Large (15-20 cm)	Très large (>20 cm)
Oiv 204	Compacité	Très lâche	Lâche	Moyenne	Compacte	Très compacte
Vassal	Millerandage	Nul ou t. fb.	Faible	Moyen	Fort	Très fort
Oiv 206	Longueur du pédoncule	Très court (<3 cm)	Court (3-5 cm)	Moyen (5-7 cm)	Long (7-10 cm)	Très long (>10 cm)
Oiv 207	Lignification du pédoncule	Base seulement		Moitié	Plus de la moitié	
Vassal	Couleur de l'axe de la rafle	1-Coloré	2-Non coloré			
Oiv 208	Forme de la grappe	1-Cylindrique	2-Conique ou pyramidale	3-En entonnoir		
Oiv 209	Présence d'un aileron	1-Absent	2- Une à trois ailes	3- Plus de trois ailes		

BAIE

Oiv 220	Longueur Valeur absolue (en cm) : 15		Très courte ($<8\text{mm}$)	Courte (8-14mm)	Moyenne (14-20mm)	Longue (20-26mm)	Très longue ($>26\text{mm}$)		
Oiv 221	Largeur Valeur absolue (en cm) : 15		Très étroite ($<8\text{mm}$)	Étroite (8-14mm)	Moyenne (14-20mm)	Large (20-26mm)	Très large ($>26\text{mm}$)		
Oiv 222	Uniformité de la grosseur		1-Non uniforme	3-Uniforme					
Oiv 223	Forme	1- Aplatie	2- Arrondie	3- Elliptique	4- Ovoïde	5- Tronc-ovoïde	6- Obovoïde	7- Cylindrique	8- Arquée
Oiv 225	Couleur épiderme		1- Vert jaune	2- Rose	3- Rouge	4- Gris	5- Rouge-Violet	6- Bleu-Noir	
Oiv 226	Uniformité couleur épiderme		1- Non uniforme	3- Uniforme					
Oiv 227	Pruine		Nul ou t. fb.	Faible	Moyenne	Fort	Très forte		
Oiv 228	Épaisseur pellicule		Très mince	Mince	Moyenne	Épaisse	Très épaisse		
Oiv 229	Ombilic (apparence)		1- Peu apparent	2- Apparent					
Oiv 229	Ombilic (dépression)		1- Déprimée	2- Non déprimée					
Oiv 230	Coloration de la pulpe		1-Non colorée	2- Colorée					
Oiv 231	Intensité de la coloration de la pulpe		Non colorée	Faible coloration	Moyenne coloration	Fort coloration	Très forte coloration		
Oiv 232	Succulence de la pulpe		1- Peu juteuse	2- Juteuse					
Oiv 233	Rendement en jus (ml / 100g baies)			Faible	Moyen	Élevé			
Oiv 235	Fermeté de la pulpe		Très faible	Faible	Moyenne	Élevée	Très élevée		
Oiv 236	Saveur		1-Aucune	2- Muscatée	3- Foxée	4- Herbacée	5-Autre		
Oiv 238	Longueur pédicelle		Très court ($<4\text{mm}$)	Court (4-8mm)	Moyen (8-12mm)	Long (12-16mm)	Très long ($>16\text{mm}$)		
Oiv 240	Séparation du pédicelle		Très facile	Facile	Moyen	Difficile	Très difficile		

PEPINS

Oiv 241	Présence de pépins	1- Absents (type corinthien)		2- Rudimentaires (type sultanien)		3-Présents
Oiv 242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : 6	Très courts	Courts	Moyens	Longs	Très longs
Oiv 243	Poids d'un pépin (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) : -----	Très faible ($<10\text{mg}$)	Faible (25mg)	Moyen (40mg)	Elevé (55mg)	Très élevé ($>65\text{mg}$)
Oiv 244	Cannelures transversales face dorsale pépins	1-Absentes	2-Présentes			

Formulaire de description 6 / 8
(après chute des feuilles)

Année : 2010^{4/01/2016}

Observateur : *Maichal*

Programme : GrapGene06

Code introduction : 0Mtp1496

Nom introduction : Negret n°1

Emplacement : **Vass2R04s311-315**

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des nœuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenœuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 351 **vigueur** * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 **longueur entrenœuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 65 mm

oiv 354 **diamètre entrenœuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : 7 mm

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal :

Nœuds : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3.

* voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »